

Ferrum Phosphoricum (Ferr-p) リン化鉄

【一般】

- 主な特徴は特徴に欠けること
- 炎症の初期
- 主に明らかな徴候のない急性疾患に用いられる
- 鬱血、太陽の熱、物理的損傷による発熱
- 顔が交互に赤くなったり青くなったりする
- 術後のひりひりする疼きと出血を制御する

【身体面】

- 風邪に起因する難聴、特に小児
- 咳と血液の糸状の線が混入した痰、または鮮血
- 幼児の気管支炎

【反応】

★ 悪化

夜、動作、音、震動、冷たい空気、抑圧された発汗、身体活動、食後、立つ

★ 好転

寒冷、出血、圧迫、ゆっくりと歩き回る、起床後、排便後、一人でいること

【食べ物】

嫌悪:肉、牛乳

欲求:アルコール

悪化:酸っぱいもの、肉

Gelsemium sempervirens (Gels.) ジャスミン(黄色い)

★ 一般的な特徴

訴えはゆっくり段々と始まる、発症に時間が掛かる。悪い知らせ、厳しい試練、予想、試験、恐怖、天候の変化(冷たい所から暖かいところへ)などが引き金となる

【一般】

- 非常な疲れ: 身体が非常に疲れている
- 無関心、無感動: 疲労、怠惰な
- 疲労: 麻痺した状態、筋肉の痛み、非常に重く弱く感じる
- 震え
- 喉の渇き
- めまい
- 熱のある間、汗をかく
- 瞼が重い
- 凍るよう、暖かくなならない
- インフルエンザ

【身体面】

- 頭痛—重い
- 鼻水

【精神面】

- 静かにしたい、一人になりたい
- 落ち込んでいても泣けない
- 恐怖感と不安: 重要な催しなどの前に悪い予想をする

【反応】

★ 悪化

身体的な疲労、病気について考えること

★ 好転

排尿、汗をかく、新鮮な空気、連続した

【妊娠、分娩、産後】

妊娠: こむら返り、めまい

分娩: 遅い、不安、背中 of 痛み、ストレス、衰弱、腰の痛み、絶望的、喉の渇き、無感動



Hepar sulphuris calcareum (Hep-s) 硫化カルシウム

★ 一般的な特徴

風邪の後、冷たい乾燥した天候が引き金となる

【一般】

- 身体の内側が暖かなくなり、冷たさ、寒さに弱く、すぐ風邪を引きやすい
- 超敏感:心身ともに、触られる事に敏感、重さに非常に敏感、もし、布団から手足が出ていたらすぐ咳やくしゃみが出る
- 痛み敏感:ちょっとした痛みで失神する、また痛みを予測しただけで悪くなる

【身体面】

- 喉に棘や魚の骨が引っかかったように感じる、赤く腫れて痛い、膿になりやすい、汗を大量にかきやすく酸味のある臭いがする
- 咳の代表的レメディーである、咳は冷たさで枯れて悪くなる、濃い黄色い痰があるが出にくい

【食べ物】

嫌悪:チーズ、風味の強い

欲求:酸っぱい物、酸、アルコール、ブランデー、
調味料をふんだんに使った食べ物、刺激物、
変わった物、
ワイン

悪化:コーヒー、冷たい食べ物、

好転:タバコ

【精神面】

- 怒りの発作を起こしやすい、いつも急いでいる、あらゆるレベルで傷つきやすい
- 極度の不安感と常に防御の必要性を感じている

【反応】

★ 悪化


冷たくなる、冷たい、乾いた気候、新鮮な空気、痛みのある方を下にして横になる、夜、圧迫、わずかでも触られる事、隙間風、布団をかけない

★ 好転

熱、暖かくくるまれること、暖かいベッド、食後、湿気のある天候

原液1滴を
溶液に
加える。

振とうした
レメディを
錠剤に
1滴落とす。



乳糖
(ラクトース)
の錠剤

1回目の 希釈	1c	2回目の 希釈	2c	3回目の 希釈	3c	4回目の 希釈	4c	5回目の 希釈	5c	6回目の 希釈	6c
------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----

希釈倍率

振とう